

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクルの 日数 | 薬剤情報 |
|------|--------------------------------|--------------|--|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 大腸癌 | <18>5-FU+I-Lv(6投2休)療法 | 56 | アイソボリン:250m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注:500m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 |
| 大腸癌 | <18>5-FU+I-Lv+Bev (6投2休) 療法 | 56 | アバスタチン点滴静注用:5m g /kg Day1 Day15 Day29 アイソボリン:250m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 フルオロウラシル注:500m g /m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 |
| 大腸癌 | <18>Cmab療法(単独) = 初回 = | 7 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>Cmab療法(単独) = 2回目以降 = | 7 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>MMC+5-FU療法 | 28 | フルオロウラシル注:1000m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 マイトマイシン注用 2 m g :10m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>5-FU+RT療法 | 7 | フルオロウラシル注:225m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 |
| 大腸癌 | <18>Pmab療法(単剤) | 14 | ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g :6m g /kg Day1 |
| 大腸癌 | <18>Bev維持療法 | 21 | アバスタチン点滴静注用:7.5m g /kg Day1 |
| 大腸癌 | <18>TAS-102+Bev療法 | 28 | アバスタチン点滴静注用:5m g /kg Day1 Day15 |
| 大腸癌 | <18>ビ`ヲ比` +Cmab療法(初回) | 7 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>ビ`ヲ比` +Cmab療法(2回目以降) | 7 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>ビ`ヲ比` +ムト比` +Cmab療法(初回) | 7 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>ビ`ヲ比` +ムト比` +Cmab療法(2回目以降) | 7 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>Cmab単剤療法(2週毎) | 14 | アービタックス注射液 1 0 0 m g :500m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>PER+HER療法(初回) | 21 | ハーセプチン注:8m g /kg Day1 パージェタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:840m g Day1 |
| 大腸癌 | <18>PER+HER療法(2nd以降) | 21 | ハーセプチン注:6m g /kg Day1 パージェタ点滴静注用 4 2 0 m g / 1 4 mL:420m g Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFOX4 | 14 | アイソボリン:100m g /m ² Day1 Day2 エルブラット:85m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注:600m g /m ² Day1 Day2 |
| 大腸癌 | <18>m-FOLFOX6 | 14 | アイソボリン:200m g /m ² Day1 エルブラット:85m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFOX4+Bev療法 | 14 | フルオロウラシル注:600m g /m ² Day1 Day2 アバスタチン点滴静注用:5m g /kg Day1 エルブラット:85m g /m ² Day1 アイソボリン:100m g /m ² Day1 Day2 フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 Day2 |
| 大腸癌 | <18>m-FOLFOX6+Bev療法 | 14 | アバスタチン点滴静注用:5m g /kg Day1 アイソボリン:200m g /m ² Day1 エルブラット:85m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>m-FOLFOX6+C-mab療法(初回用) | 14 | エルブラット:85m g /m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :400m g /m ² Day1 アイソボリン:200m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day8 |
| 大腸癌 | <18>m-FOLFOX6+C-mab療法(2回目以降) | 14 | エルブラット:85m g /m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 m g :250m g /m ² Day1 Day8 アイソボリン:200m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:400m g /m ² Day1 フルオロウラシル注:2400m g /m ² Day1 |

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクルの 日数 | 薬剤情報 |
|------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 大腸癌 | <18>XELOX療法 | 21 | エルブラット:130mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>XELOX+Bev療法 | 21 | アバスチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 エルブラット:130mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>m-FOLFOX6+P-mab療法 | 14 | ベクティビックス点滴静注 1 0 0 mg :6mg/kg Day1 アイソボリン:200mg/m ² Day1 エルブラット:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFOXIRI療法 | 14 | アイソボリン:200mg/m ² Day1 エルブラット:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:3200mg/m ² Day1 イリノテカン注:165mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFOXIRI+Bev療法 | 14 | アイソボリン:200mg/m ² Day1 エルブラット:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:3200mg/m ² Day1 イリノテカン注:165mg/m ² Day1 アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 |
| 大腸癌 | <18>SOX+Bev療法 | 21 | アバスチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 エルブラット:130mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI療法 | 14 | アイソボリン:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI+Bev療法 | 14 | アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 アイソボリン:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI+C-mab (初回用) | 14 | イリノテカン注:150mg/m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 mg :400mg/m ² Day1 アイソボリン:200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 mg :250mg/m ² Day8 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI+C-mab療法 (2回目以降) | 14 | イリノテカン注:150mg/m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 mg :250mg/m ² Day1 Day8 アイソボリン:200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI+P-mab療法 | 14 | ベクティビックス点滴静注 1 0 0 mg :6mg/kg Day1 アイソボリン:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>CPT-11+C-mab療法 = 初回 | 14 | アービタックス注射液 1 0 0 mg :400mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 アービタックス注射液 1 0 0 mg :250mg/m ² Day8 |
| 大腸癌 | <18>CPT-11+C-mab療法 = 2回目以降 | 14 | アービタックス注射液 1 0 0 mg :250mg/m ² Day1 Day8 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>CPT-11+P-mab療法 | 14 | ベクティビックス点滴静注 1 0 0 mg :6mg/kg Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 |

| がん種別 | レジメン名 | 1サイクルの 日数 | 薬剤情報 |
|------|---------------------------------|--------------|--|
| | | | 薬品名：数量 投与日 |
| 大腸癌 | <18>IRIS療法 | 28 | イリノテカン注:125mg/m ² Day1 Day15 |
| 大腸癌 | <18>IRIS+Bev療法 | 28 | アバスチン点滴静注用:5mg/kg Day1 Day15 イリノテカン注:100mg/m ² Day1 Day15 |
| 大腸癌 | <18>CPT-11療法 (bi-Weekly) | 14 | イリノテカン注:150mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>CPT-11+C-mab (bi-weekly) 療法 | 14 | アービタックス注射液 100mg :500mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI+Ram療法 | 14 | サイラムザ注:8mg/kg Day1 アイソボリン:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:180mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>FOLFIRI+ザルトラップ療法 | 14 | ザルトラップ点滴静注:4mg/kg Day1 アイソボリン:200mg/m ² Day1 イリノテカン注:150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:400mg/m ² Day1 フルオロウラシル注:2400mg/m ² Day1 |
| 大腸癌 | <18>XELIRI+Bev療法 | 21 | アバスチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 イリノテカン注:200mg/m ² Day1 |